



ENVIRONMENT PROFESSIONAL SERVICES

VACCINE PHÒNG BỆNH HÔ HẤP CHỦ ĐỘNG CHO HEO

DS-APH-PIGVAC

CHỦ ĐỘNG PHÒNG APP – TỤ HUYẾT TRÙNG – GLÄSSER

APH APP (serotype 1-2-5 + giải độc tố I-II-III)
Glässer – *Haemophilus parasuis* (serotype 1-4-5)
Tụ huyết trùng – *Pasteurella multocida* type A

- 1 **TỐI ƯU TỪNG MŨI TIÊM**
- 2 **ĐỘ AN TOÀN CAO**
- 3 **BẢO HỘ KÉO DÀI**
- 4 **10 TRONG 1**



✓ **VẮC XIN ĐA GIÁ PHÒNG BỆNH HÔ HẤP DO VI KHUẨN**


**TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ TỐI ƯU QUY TRÌNH
GIẢM KHÁNG SINH-TĂNG HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI**

 **MANUFACTURED BY
DAESUNG MICROBIOLOGICAL LABS.CO.,LTD.**

DS APH Pigvac Đánh giá năng suất


TĂNG TRỌNG BÌNH QUÂN

Trọng lượng nhóm heo tiêm vắc xin cao hơn so với trọng lượng nhóm heo đối chứng




TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

Triệu chứng lâm sàng (ho, thở khó, ủ rũ, sốt cao, đột tử) trong nhóm tiêm vắc xin giảm 36% so với nhóm đối chứng




DS APH Pigvac Đánh giá bệnh tích



Vắc-xin

Không thấy tổn thương phổi



Nhóm không tiêm vắc-xin

Viêm màng phổi huyết thanh, viêm phổi hoại tử và viêm đa thanh mạc được quan sát thấy ở phổi của heo chết trong nhóm chưa tiêm vắc-xin.

Thành phần kháng nguyên trên mỗi liều

- *Actinobacillus pleuropneumoniae* serotype 1.....trên 2×10^9 CFU
- *Actinobacillus pleuropneumoniae* serotype 2trên 2×10^9 CFU
- *Actinobacillus pleuropneumoniae* serotype 5.....trên 2×10^9 CFU
 - *Actinobacillus pleuropneumoniae* toxoid I.....trên 40 microgram
 - *Actinobacillus pleuropneumoniae* toxoid II.....trên 40 microgram
 - *Actinobacillus pleuropneumoniae* toxoid III.....trên 40 microgram
- *Haemophilus parasuis* serotype 1.....trên 2×10^9 CFU
- *Haemophilus parasuis* serotype 4.....trên 2×10^9 CFU
- *Haemophilus parasuis* serotype 5.....trên 2×10^9 CFU
- *Pasteurella multocida* type A.....trên 2×10^9 CFU
- Tã được.....vừa đủ

Liều lượng và hướng dẫn sử dụng

Heo con: 2 ml/con -Tiêm bắp (I.M)

- Mũi 1: 3-4 tuần sau sinh
- Mũi 2: 5-6 tuần sau sinh